AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAININ DE L'AGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL

AGONNEMENT ANNUEL
Régisseur de recettes de la D.D.A.
C.C.P. Montpellier \$238-67

5 MAI 1983

BULLETIN N° 5 DESTINE AUX AGRICULTEURS DU LAURAGAIS (rédigé en collaboration avec la Ferme de Loudes, les G.V.A., et l'I.T.C.F.)

CEREALES

140 champs ont été observés au cours de la dernière tournée du réseau grandes cultures.

LA ROUILLE BRUNE

n'a que peu progressé, cependant l'approche de l'épiaison et les conditions climatiques favorables nous amènent à vous conseiller de suivre de très près, vos parcelles de MONDUR, CASTAN, ROAZON.

LA SEPTORIOSE

ne progresse pas et reste cantonnée à la base ainsi que l'oïdium.

TRAITEZ si vous constatez sur vos cultures ayant atteint le stade 9, la présence sur la F3, de rouille brune ou de septoriose ou des deux maladies en même temps, intervenez avec une spécialité efficace sur ces maladies.

Parmi celles qui sont homologuées, vous trouverez à la C.A.L.

Tilt C à utiliser à la dose de 1 litre à 1'hectare

Tilt C à utiliser à la dose de l litre à l'hectare ou Vigil K à utiliser à la dose de 1,25 litre à l'hectare.

POIS PROTEAGINEUX

Visitez vos cultures de pois.

L'ANTHRACNOSE

reste présente dans de nombreuses parcelles, et les PUCERONS ont fait leur apparition.

Pour l'anthracnose, votre coopérative dispose de Peltar à appliquer à raison de 4 kilo/hectare et pour les pucerons de Pirimor G à utiliser à la dose de 0,5 g/hectare.

Le mélange des deux spécialités est possible.

7 37

masiler

PUCERONS


Notre conseil du 28 avril reste valable.

a 4 th sea introduced to separate

TRACES seriosmost 10.0

STADE DE DEVELOPPEMENT DU BLE - ECHELLE DE FEEKES D'après E.C. LARGE

COLUMN ENGLISH THE SECTION OF THE



Tirage du 5 mai 1983 - 1 000 exemplaires

© Bulletin Technique des Avertissements Agricoles - MONTPELLIER 1983

Pour l'anthrachose, voire congérative dispose de folter à appliquer à raison de 4 bilos

ER TER TO A CONTROL OF THE RESERVE OF THE CONTROL O

hactars at pour les pocerons de Firther II autiliser à la dose de 0,5 g/bectare.